

DISPOMEDIC SOLUCIÓN JABONOSA

PRESENTACIÓN

REFS	DESCRIPCIÓN	UN/ CAJA	MEDIDAS CAJA (CM)	PESO CAJA (KG)	
DPMJ500B	DISPOMEDIC SOLUCIÓN JABONOSA 500 ML (7,5%) CON BOMBA	12	29x22x22,5	6,4	
DPM1000	DISPOMEDIC SOLUCIÓN JABONOSA 1000 ML (7,5%)	8	35x18x26	8,5	

COMPOSICION

Jabón de Povidona Yodada al 7,5%.
Polivinilpirrolidona-Yodo al 7,5% (0,75% de Iodo disponible)
Sodium Laureth Sulfate al 1,3%
Excipientes c.s.p. 100%

PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto: Líquido sin partículas en suspensión.
Color: pardo-amarillento
Yodo disponible (%): $0,75 \pm 0,3$
pH: $4,5 \pm 1,5$
Densidad (g/ml): $1,020 \pm 0,02$
Solubilidad: soluble en agua y alcohol.

EFICACIA

Bactericida	UNE-EN 13727:2012+A1 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Tiempo: 1 y 5 minutos en área médica en condiciones sucias. UNE-EN 12791:2006 Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Tiempo: 5 minutos en condiciones de uso quirúrgico reales sobre los microorganismos presentes en las manos de los voluntarios. UNE-EN 1499:1997 Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos. Tiempo: 3 minutos en lavado higiénico de manos.
Levuricida	UNE-EN 13624:2014 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Tiempo: 1 y 5 minutos sobre instrumental de uso médico en condiciones sucias. UNE-EN 1650:2008 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área alimentaria, industrial, doméstica e institucional. Tiempo: 1 minuto en test de suspensión para área alimentaria, doméstica e institucional.

ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS

Parámetro	Tolerancia	Unidades
Aerobios totales	< 100	CFU/ml
Mohos y levaduras	< 100	CFU/ml
Pseudomonas aeruginosa	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml
Staphylococcus aureus	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml
Escherichia coli	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml
Candida albicans	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml

INDICACIONES

Lavado y desinfección de las manos y de la piel sana.

MODO DE EMPLEO

Utilizar una pequeña cantidad del producto frotando entre 2 y 5 minutos hasta obtener espuma. Aclarar abundantemente con agua o con una gasa estéril impregnada de agua.

ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítese el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No debe emplearse junto con preparados mercuriales. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante un tiempo prolongado. No mezclar con otros productos. Manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos y de bebidas. No utilizar en neonatos, ni en mujeres en el periodo perinatal, ni durante el periodo de lactancia. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse la aplicación. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf: 91 562 04 20. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Nº Reg AEMPS: 756-DES Biocida grupo principal PT1