

DISPOYOD SOLUCIÓN

PRESENTACIÓN

REFS	DESCRIPCIÓN	UN / CAJA	MEDIDAS CAJA (CM)	PESO CAJA (KG)	
DPY0050	DISPOYOD POVIDONA YODADA (10%) 50ML	96	24,8x33,2x19,3	6,3	
DPY0125	DISPOYOD POVIDONA YODADA (10%) 125ML	12	15x19,7x14,7	1,9	
DPY0500	DISPOYOD POVIDONA YODADA (10%) 500ML	12	29x22x21,5	6,6	

COMPOSICIÓN

Solución de Povidona Yodada al 10%.
Polivinilpirrolodona-Yodo 10%.(1% de Iodo disponible)
Excipientes c.s.p. 100%

PROPIEDADES FÍSICAS

Aspecto: Líquido sin partículas en suspensión.
Color: pardo-amarillento.
Yodo disponible (%): $1 \pm 0,3$
pH: $4,5 \pm 1,5$
Densidad (g/ml): $1,038 \pm 0,03$
Solubilidad: Soluble en agua y alcohol.

EFICACIA

Bactericida	- UNE-EN 13727:2012+A1 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Tiempo: 1 y 5 minutos en área médica en condiciones sucias. - UNE-EN 12791:2006 Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Tiempo: 5 minutos en condiciones de uso quirúrgico reales sobre los microorganismos presentes en las manos de los voluntarios.
Levuricida	UNE-EN 13624:2014 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Tiempo: 1 y 5 minutos sobre instrumental de uso médico en condiciones sucias.

ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS

Parámetro	Tolerancia	Unidades
Aerobios totales	< 100	CFU/ml
Mohos y levaduras	< 100	CFU/ml
Pseudomonas aeruginosa	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml
Staphylococcus aureus	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml
Escherichia coli	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml
Candida albicans	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml

INDICACIONES

Antiséptico para piel sana. Desinfecta la piel antes de cualquier tipo de intervención.

MODO DE EMPLEO

Depositar 3 ml sobre un apósito y aplicar sobre la piel manteniendo el contacto durante 5 minutos. Dejar secar al aire.

ADVERTENCIAS

No ingerir. Uso externo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación ocular grave. Evítase el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No debe emplearse junto con preparados mercuriales. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante un tiempo prolongado. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas con alteraciones tiroideas. Manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos y bebidas. No utilizar en neonatos, ni en mujeres en el periodo perinatal, ni durante el periodo de lactancia. Utilizar con precaución en niños de 2 años. En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse la aplicación.

En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf: 91 562 04 20. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Nº Reg AEMPS: 405-DES Biocida grupo principal PT1.