

# DISPOMEDIC SOLUTION SAVONNEUSE

## Savon à la Povidone Iodée 7,5 %

Savon antiseptique recommandé pour le lavage des mains du personnel dans tous les domaines où une désinfection est nécessaire.

### INFORMATIONS DU PRODUIT

**FINALITÉ :** Pour un lavage hygiénique des mains et une peau saine des patients.

**COMPOSITION :** Savon à la Povidone Iodée 7,5 %. Polyvinylpyrrolidone-Iode à 7,5 % (0,75 % d'Iode disponible), Laureth Sulfate de Sodium à 1,3 %, Excipients q.s.p. 100 %

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide sans particules en suspension

0.75± 0.3

Densité (g/ml) : 1020± 0.02

Couleur : Brun jaunâtre

Iode disponible (%) :

pH : 4.5 ± 1.5

Solubilité : soluble dans l'eau et l'alcool



### MODE D'EMPLOI

Utiliser une petite quantité du produit et frotter entre 2 et 5 minutes pour obtenir de la mousse. Rincer abondamment à l'eau ou avec une gaze stérile imbibée d'eau.

### EFFICACITÉ

#### BACTÉRICIDE

**UNE-EN 13727:2012+A1** Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide dans le domaine médical. Temps : 1 et 5 minutes en zone médicale dans des conditions sales.

**UNE-EN 12791:2006** Antiseptiques et désinfectants chimiques. Désinfection chirurgicale des mains. Temps : 5 minutes dans des conditions réelles d'utilisation chirurgicale sur les microorganismes présents dans les mains des volontaires.

**UNE-EN 1499:1997** Antiseptiques et désinfectants chimiques. Lavage hygiénique des mains. Temps : 3 minutes pour le lavage hygiénique des mains.

#### LÉVURICIDE

**UNE-EN 13624:2014** Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide en médecine. Temps : 1 et 5 minutes sur les instruments médicaux dans des conditions sales. **UNE-EN 1650:2008** Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de

l'activité fongicide ou levuricide des antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés dans le domaine alimentaire, industriel, domestique et institutionnel. Temps : Test de 1 minute en suspension dans le domaine alimentaire, domestique et institutionnel.

### ÉTUDES MICROBIOLOGIQUES

| Paramètre              | Tolérance             | Unités |
|------------------------|-----------------------|--------|
| Total aérobies         | < 100                 | CFU/ml |
| Moisissures et levures | < 100                 | CFU/ml |
| <i>P. aeruginosa</i>   | Absence dans 1g ou ml | CFU/ml |

| Paramètre        | Tolérance             | Unités |
|------------------|-----------------------|--------|
| <i>S. aureus</i> | Absence dans 1g ou ml | CFU/ml |
| <i>E. coli</i>   | Absence dans 1g ou ml | CFU/ml |

### AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SÉCURITÉ

Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ne pas avaler. Usage externe. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les zones cutanées sensibles. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. Ne pas utiliser avec des préparations à base de mercure. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses composants, ni sur des zones étendues de la peau, ni pendant une période prolongée. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Tenir hors de portée des enfants et loin de la nourriture et des boissons. Ne pas utiliser chez les nouveau-nés, ni chez les femmes en période périnatale, ni pendant la période d'allaitement. Utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans. Dans de rares cas d'irritation ou d'allergie cutanée, interrompre l'application. Si un avis médical est nécessaire, garder le récipient ou l'étiquette à portée de main. En cas d'empoisonnement ou d'ingestion accidentelle, appelez le Service Médical d'Information Toxicologique, Tél. : 91 562 04 20 Pour éviter les risques pour les personnes et l'environnement, respectez les instructions d'utilisation

**Stockage et durée d'utilisation**

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil.

| PRÉSENTATION |                                                          |                |                       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                                              | UNITÉS / BOÎTE | DIMENSIONS BOÎTE (cm) | POIDS BOÎTE* (kg) |
| DPM0500      | DISPOMEDIC SOLUTION SAVONNEUSE 500 ml (7.5 %) AVEC POMPE | 12             | 29x22x22.5            | 6.4               |
| DPM1000      | DISPOMEDIC SOLUTION SAVONNEUSE 1000 ml (7.5 %)           | 8              | 35x18x26              | 8.5               |

\* TOLÉRANCES : Poids  $\pm$  0.5 Kg

N° Reg. AEMPS : 756-DES Biocide principal groupe  
PT1 Entreprise certifiée ISO 22716 et ISO 9001



FABRIQUÉ PAR : ALCOHOLES MONTPLET, S.A. C/ VIA TRAJANA, 53-55 (BARCELONE)