

# DISPOYOD

## Solución de Povidona Yodada al 10%

Líquido antiséptico para la desinfección pre-operatoria de la piel sana y zonas de punción.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**FINALIDAD:** Antiséptico para piel sana. Desinfectante de la piel antes de cualquier tipo de intervención.

**COMPOSICIÓN:** Solución de Povidona Yodada al 10%. Polivinilpirrolodona-Yodo al 10% (1% de Iodo disponible), Excipientes c.s.p. 100%



### CARACTERÍSTICAS

**Aspecto:** Líquido sin partículas en suspensión  
**Yodo disponible (%):** 1 ± 0.3  
**Densidad (g/ml):** 1.038 ± 0.03

**Color:** Pardo-amarillento  
**pH:** 4.5 ± 1.5  
**Solubilidad:** soluble en agua y alcohol

### MODO DE EMPLEO

Utilizar una pequeña cantidad del producto frotando entre 2 y 5 minutos hasta obtener espuma. Aclarar abundantemente con agua o con una gasa estéril impregnada de agua.

### EFICACIA

#### BACTERICIDA

**UNE-EN 13727:2012+A1** Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Tiempo: 1 y 5 minutos en área médica en condiciones sucias.

**UNE-EN 12791:2006** Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Tiempo: 5 minutos en condiciones de uso quirúrgico reales sobre los microorganismos presentes en las manos de los voluntarios.

#### LEVURICIDA

**UNE-EN 13624:2014** Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Tiempo: 1 y 5 minutos sobre instrumental de uso médico en condiciones sucias.

### ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS

Parámetro	Tolerancia	Unidades
Aerobios totales	< 100	CFU/ml
Mohos y levaduras	< 100	CFU/ml
<i>P. aeruginosa</i>	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml

Parámetro	Tolerancia	Unidades
<i>S. aureus</i>	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml
<i>E. coli</i>	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml
<i>C. albicans</i>	Ausencia en 1g o ml	CFU/ml

### ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

No ingerir. Uso externo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación ocular grave. Evítase el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. No debe emplearse junto con preparados mercuriales. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante un tiempo prolongado. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas con alteraciones tiroideas. Manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos y bebidas. No utilizar en neonatos, ni en mujeres en periodo perinatal, ni durante el periodo de lactancia. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. En los raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse la aplicación. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar.

PRESENTACIÓN REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS CAJA /	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
DPY0050	DISPOYOD POVIDONA YODADA 10% 50ml	96	34.5x25.5x21	6.4
DPY0125	DISPOYOD POVIDONA YODADA 10% 125ml	12	19.5x15x16	1.9
DPY0500	DISPOYOD POVIDONA YODADA 10% 500ml	12	34.5x29x20	9.9
DPY1000	DISPOYOD POVIDONA YODADA 10% 1000ml	8	35x18x27	8.9

\* TOLERANCIAS: Peso  $\pm$  0.5 Kg

Nº Reg. AEMPS: 405-DES Biocida grupo principal PT1  
 Empresa certificada ISO 9001.

